

# Trebby

*Tutti i profumi per Trebbiano e Garganega*

## APPLICAZIONI

Ceppo di *Saccharomyces cerevisiae* indicato principalmente per la fermentazione primaria di uve bianche con esile patrimonio aromatico.

**Trebby** si distingue per l'elevata produzione di esteri ed acetati di fermentazione, tanto maggiore quanto più è curata la nutrizione azotata.

Nella selezione di questo lievito si è prestata particolare attenzione alla sicurezza fermentativa, prediligendo un ceppo di buona vigoria con tempi di esaurimento degli zuccheri generalmente rapidi.

**Trebby** può essere impiegato con successo anche in mosti, bianchi o rossi che, a causa dell'imperfetta maturazione delle uve, abbiano un contenuto aromatico inferiore alle attese.

Per ottenere i migliori risultati organolettici e di longevità dei vini, è consigliabile impiegare **Trebby** in abbinamento ad una corretta nutrizione, completa di fattori protettivi. In questo modo gli aromi e la freschezza conferiti dal lievito saranno preservati da un precoce invecchiamento.

## PROPRIETA' MICROBIOLOGICHE

*Saccharomyces cerevisiae*.

- Fattore killer: presente.
- Condizioni di fermentazione:  $T > 14$  °C.
- Potere alcoligeno: 14% v/v.
- Cinetica di fermentazione: avvio di fermentazione veloce e decorso regolare.
- Richiesta di nutrienti: la buona nutrizione favorisce la sintesi aromatica.
- Bassa produzione di acetaldeide, di acidità volatile e composti solforati.

## PROPRIETA' ENOLOGICHE

- Caratteristiche aromatiche: elevata produzione di aromi fermentativi.
- Proprietà gustative: profumi fruttati e buona acidità in bocca.
- Tecnologie: fermentazione primaria, mosti da macerazione carbonica.
- Vitigni consigliati: Trebbiano, Garganega e vitigni bianchi neutri.

## DOSI

Vinificazione in bianco e rosato: 20-30 g/hl.

## CONFEZIONI

Pacchetti sottovuoto da 500 g.

Sacchi sottovuoto da 10 kg.

## CONSERVAZIONE

Mantenere il prodotto nella sua confezione integra e in luogo fresco.

## PREPARAZIONE


Reidratare in acqua pulita in rapporto 1:10, a una temperatura di 37 °C. Lasciare riposare per 15 minuti, poi agitare 2-3 volte in 15 minuti, quindi incorporare al mosto.

La durata totale della reidratazione non deve superare i 45 minuti. La differenza di temperatura tra il mosto e il lievito reidratato non deve essere superiore a 10 °C. L'impiego di wynTube Prepara in reidratazione migliora l'espressione del lievito.


Non utilizzare sali ammoniacali nel mezzo di reidratazione.

È sconsigliato l'utilizzo del mosto come mezzo di reidratazione.

## CARATTERI



## EFFICACIA



**Dal Cin Gildo spa**

20863 Concorezzo (MB)

Via I Maggio, 67 - Italy

[www.dalcin.com](http://www.dalcin.com) - [info@dalcin.com](mailto:info@dalcin.com)